

PRT's und Antikoagulanzen

Wer führt PRTs und Facetteninfiltrationen durch ?

PRTs und Facetteninfiltrationen der HWS werden von Dr. Grützner, Dr. Grust und Fr. Dr. Schwarz durchgeführt.

An der LWS werden alle Behandlungen von allen Ärzten durchgeführt.

Welche Kontraindikationen bestehen bei medikamentös beeinflusster Blutgerinnung ?

Heparin

Heparin ist keine Kontraindikation für PRT's und Facetteninfiltrationen.

Vor der Therapie ist der Arzt nochmals auf die Heparin-Therapie hinzuweisen.

Acetylsalicylsäure (ASS, Aspirin)

Heparin ist keine Kontraindikation für PRT's und Facetteninfiltrationen. Vor der Therapie ist der Arzt nochmals auf die Heparin-Therapie hinzuweisen. Der Arzt verwendet hierbei die dünnen atraumatischen Nadeln.

Marcumar

Nimmt der Patient Marcumar ein, muss ein aktueller (letzte 3 Tage) Quickwert vorliegen. Die PRT ist nur möglich wenn der Quick über 50 % liegt.

Weitere Thrombozytenaggregationshemmer:

z.B. Ticlopidin, Tirofiban (Agrastat), Clopidogrel (in Iscover, Plavix)

Individuelle Entscheidung des Arztes. Rücksprache mit dem Arzt, bevor der Patient ins Gerät kommt.